

Umgang mit COVID-19-verdächtiger Symptomatik in Kitas und Schulen

1 Reihentestungen asymptomatischer Kinder/SuS/Betreuungspersonal in Kitas und Schulen

- Die Reihentestung asymptomatischer Kinder in den Kitas und der SuS in Schulen wird ab sofort ausgesetzt. Dieses gilt auch für das betreuende Personal in Kitas und Schulen.
- Damit wird neben dem Kontaktpersonenmanagement in Kitas und Schulen auch das Fließschema „Handlungsempfehlung für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen bei Kindern mit Akuter Respiratorischer Symptomatik (ARE) außer Kraft gesetzt.

2 Testung symptomatischer Kinder/SuS/Betreuungspersonal in Kitas und Schulen

- Symptomatische Kinder/SuS/Betreuungspersonal testen sich mittels Antigentest* vor Betreten der Einrichtung in der Häuslichkeit:
verpflichtend für Schulen **
dringende Empfehlung für Kitas
- bei anhaltender Symptomatik Wiederholung des Antigentests alle zwei Tage
- Bei negativem Antigentest* ist das Betreten der Einrichtung erlaubt.
- Bei positivem Antigentest* muss das Antigentestergebnis mittels PCR-Test bestätigt werden (direkt in einem Abstrichzentrum oder bei erforderlicher Arztkonsultation über den Haus-/ Kinderarzt).
 - Bei **negativem** PCR-Test ist das Betreten der Einrichtung erlaubt.
 - Bei **positivem** PCR-Test ist die häusliche Isolation erforderlich.
 - Die Isolation endet frühestens nach Ablauf von 5 Tagen, sofern zuvor 48 Stunden Symptomfreiheit bestand (Tag der PCR-Abstrichnahme = Tag 0).
 - dringende Empfehlung: Ab Tag 6 tägliche Ag-Selbsttestung – bei positivem Testergebnis fortgesetzte Selbstisolation bis zum negativen Testergebnis
 - Die Isolation dauert maximal 10 Tage.

3. Hinweis für Kontaktpersonen

- Besuch der Einrichtung ist bei Symptomfreiheit möglich.
- dringende Empfehlung zur Kontaktreduzierung, vor allem mit Risikogruppen für einen schweren Krankheitsverlauf
- dringende Empfehlung zur Symptombeobachtung und täglichen (Selbst-)Testung mit Antigen-Schnelltests* für 5 Tage

* Antigentest, PEI-gelistet mit hinreichender Sensitivität <https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests.pdf>

** Durchführung in der Häuslichkeit mit Selbsterklärung der Eltern bzw. der MitarbeiterInnen möglich

Quellen:
- Robert-Koch-Institut (Empfehlungen zu Isolierung und Quarantäne bei SARS-CoV-2-Infektion und -Exposition, Stand 2.5.2022)
- Corona-LVO M-V vom 31.3.2022 (zuletzt geändert: 5.5.2022); 2. Corona-KiföVO ÄndVO M-V (12.5.2022), 2. ÄndVO der 6. SchulCoronaVO M-V (12.5.2022)